

# <訂正とお詫び>



パンフレット(平成28年4月 No.2発行)  
 「秋まき小麦・春まき小麦の病害虫と防除」において、  
 P6と表4の一覧表のなかで  
 訂正する部分がありますので紹介してお詫びします。

## 【6p】病害に対する指導参考薬剤 ※指導参考事項該当病害名 うどんこ病の項／訂正

病害に対する指導参考薬剤

(2015年12月現在)

処理方法	系統名	商品名	指導参考事項 該当病害名			有効成分  成分名	適正使用基準		処理濃度 ・量等
			眼紋病	うどんこ病	赤さび病		使用時期	回数	
茎葉散布	DMI	シルバキュアフロアブル	●	●	●	テブコナゾール	収穫7日前まで	2回以内	2,000
		リベロ水和剤	●	●	●	メトコナゾール	7	3	2,000
		トリフミン水和剤	●	○	○	トリフルミゾール	14	3	1,000~2,000
		スポルタック乳剤	●	○	○	プロクロラズ	30	2	600
		チルト乳剤25	●	○	○	プロピコナゾール	3	春期以降3	1,000 2,000 3,000

### ※注釈の訂正

- 注1) ●: 指導参考薬剤 ○: 登録はあるが指導参考になっていない薬剤  
 注2) ■ 病害欄は耐性菌または低感受性菌が確認されている  
 注3) □ うどんこ病のDMI系薬剤は一部地域で感受性が低下している

## 【表4】害虫に対する指導参考薬剤 バイスロイド乳剤 処理濃度・量等の項／訂正

害虫に対する指導参考薬剤

(2015年12月現在)

処理方法	毒性	系統名	商品名	指導参考事項該当病害虫名					有効成分  成分名	適正使用基準		処理濃度 ・量等
				ア フ フ ム ン 類	キ レ ナ カ ア シ	ア フ ヨ ト ウ	ム キ キ モ ク リ バ エ	ム キ ク ロ ハ マ リ バ エ		使用時期	回数	
茎葉散布	劇	有機リン・MBC	スミトップM粉剤	●					MEP・チオファネートメチル	14	1	4kg
			スミチオン粉剤2DL	●					MEP	14	1	4kg
		有機リン	スミチオン乳剤	●	●	●			MEP	7	1	1,000
			エルサン乳剤	●	●	●	●		PAP	7	4	1,000
		ビスロイド	トレボン粉剤DL	●					エトフェンブロックス	14	2	4kg
			トレボン乳剤	○	●				エトフェンブロックス	14	2	2,000
			トレボンEW(乳剤)	○	●				エトフェンブロックス	14	2	1,000
			アグロスリン乳剤	○					シベルメリン	21	3	2,000
			ゲットアウトWDG	●	●				シベルメリン	21	3	3,000
			ペイオフME液剤	●					フルシトリネート	7	2	2,000
			サイハロン乳剤	○	●				シハロリン	21	3	2,000
			バイスロイド乳剤	●					シフルトリン	7	3	2,000
		ネオニコチノイド	アドマイヤー顆粒水和剤	●					イミダクロプリド	21	2	15,000
			モスピラン水溶剤(顆粒)	●					アセタミプリド	7	2	4,000
			モスピランSL液剤	○	●				アセタミプリド	7	2	4,000
少量散布	半翅目摂食阻害剤	ウララDF	●					フロニカミド	7	2	4,000	
		有機リン	スミチオン乳剤	●					MEP	7	1	250.25%